

FICHA
TÉCNICA

COBREX 4G



NOMBRE COMERCIAL: COBREX 4G

Tipo de formulación: Líquido soluble

Uso: Agrícola

Función: Desinfectante

Composición porcentual: Compuesto de amonio cuaternario
Equivalente a 494 g de I.A. 20° C 50% + Sulfato de cobre
pentahidratado equivalente a 296.4 g de I.A. a 20° C 20%

Presentaciones:



INFORMACIÓN GENERAL

COBREX 4G es un producto formulado con amonios cuaternarios y sulfato de cobre pentahidratado, con acción biocida superior y alto espectro sobre microorganismos microbianos tales como bacterias gram positivas y gram negativas, hongos, levaduras y virus. **COBREX 4G** actúa por contacto sobre los patógenos, inhibiendo la cadena respiratoria, por la obstrucción de procesos ribosomáticos y mediante la inactivación de enzimas celulares de los microorganismos. Su acción preventiva y curativa, con gran movilidad y traslocación le confieren un efecto sistemático local, logrando una mayor persistencia sobre áreas y superficies tratadas.

USOS RECOMENDADOS

Cultivo	Dosis	Recomendaciones
Hortalizas. Aplicación foliar	1 a 2 L/ha	Realizar de 2 a 3 aplicaciones al follaje, al observar los primeros indicios a un intervalo de 7 días. Volumen de aplicación 400 a 600 L/ha
Hortalizas. Aplicación al suelo	2 a 3 L/ha	Realizar 2 aplicaciones de drench a intervalo de 7 días, iniciando al 3er día después del trasplante y 7 días después de la primera aplicación, o cuando las condiciones ambientales favorezcan la presencia de microorganismos. Volumen de agua: 800-1200 L de agua /ha

MS AGROS, S.A. DE C.V.

Calle Esperanza No. 25, Colonia Barrio de Ixtlahuacán. Yauatepec,
Morelos. C.P. 62731
Teléfono: (735) 392 09 43



www.msagros.com.mx

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante la preparación y aplicación del producto, use siempre el equipo de protección personal descrito en el apartado de "Precauciones y advertencias de uso de esta etiqueta". Abra el envase girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Posteriormente, invierta la tapa, presionando con fuerza sobre el sello de seguridad del envase y gire con cuidado, hasta romper el sello de seguridad. Añada un poco de agua al tanque de mezclas, acondicione el pH del agua con Acidix pH en el rango de 6.0 a 7.0. Vierta la cantidad de producto conforme a lo indicado en esta etiqueta hasta homogenizar la mezcla. Comience a agitar para homogenizar la mezcla y termine de llenar el tanque con la cantidad de agua suficiente mientras continúa agitando. Para conseguir un control efectivo se debe lograr una buena cobertura de los cultivos tratados. Se recomienda calibrar su equipo de aplicación dependiendo la etapa fenológica del cultivo. Aplique por la mañana o al atardecer (evite temperaturas extremas). Aplique la mezcla el mismo día de su preparación.

CONTRAINDICACIONES

No aplique en plantas estresadas, deshidratadas o en plantas que tengan síntomas de fitotoxicidad. No aplique en cultivos o variedades sensibles. No aplique durante horas de sol intenso, en días con lluvia o cuando el viento favorezca la deriva. Siempre realice pruebas de compatibilidad o fitotoxicidad antes de incorporar un producto nuevo a su bitácora de aplicaciones.

INCOMPATIBILIDAD

No mezcle con Hierro (Fe) y compuestos azufrados. Para realizar mezclas, siempre realice pruebas de compatibilidad, si no está seguro de los resultados consulte a su técnico. Respete las dosis y frecuencias de aplicación.

GARANTÍA

MS Agros, S.A. DE C.V. garantiza el contenido neto y composición porcentual del producto indicado en esta etiqueta, no se hace responsable por el mal uso y manejo durante su almacenamiento, transporte o aplicación, ya que se encuentra fuera de nuestro control.